

Guía para reconocer señales de urgencia veterinaria

Las señales que indican que tu conejo necesita un veterinario de exóticos hoy mismo, qué hacer mientras llegas y qué no hacer.



Recurso educativo. No sustituye la valoración de un veterinario con experiencia en conejos. Si tu conejo deja de comer o de hacer cacas, respira con dificultad, está decaído o tiene dolor, contacta con tu clínica de inmediato.

⚠ Atención veterinaria urgente

Ante cualquiera de estas señales, llama o acude hoy mismo a tu veterinario de exóticos o a una clínica de urgencias. Si dudas, trátalo como una urgencia.

Señales de urgencia

Señal	Qué puedes ver	Qué hacer
No come o no hace cacas	Rechaza el heno y su premio favorito; cacas muy pequeñas, deformes o ninguna; encorvado, apático	Veterinario lo antes posible, sin esperar a mañana. No le des medicamentos para el intestino por tu cuenta.
Barriga hinchada	Abdomen abultado o tenso, con poco apetito y pocas o ninguna caca	Veterinario de inmediato: puede empeorar en cuestión de horas.
Dificultad para respirar	Respira con la boca abierta, respiración rápida o con esfuerzo	Veterinario de inmediato. Los conejos respiran normalmente por la nariz.
Cabeza inclinada	Cabeza ladeada, pérdida de equilibrio, caídas, gira en círculos, movimientos rápidos de los ojos	Llama siempre al veterinario; ve de inmediato si además pierde el equilibrio, se cae, está angustiado o deja de comer.
Miasis (larvas de mosca)	Huevos o larvas en el pelo, sobre todo alrededor del trasero y la cola	Urgencia siempre. No mojes el pelo: el veterinario necesitará rasurarlo.
Colapso	Tumbado sin reaccionar, muy débil; puede estar muy frío o muy caliente	Colócalo con cuidado en el transportín sobre una manta y ve al veterinario de inmediato.
Golpe de calor	Orejas rojas y calientes, respiración rápida y superficial, boca abierta, apatía, temblores, tambaleo, convulsiones o colapso	Empieza a enfriarlo (ver abajo) y llama al veterinario mientras sales hacia la clínica.
Traumatismo o posible fractura	Caída, golpe, cojera fuerte, no apoya una pata	Veterinario de inmediato: necesita tratamiento y control del dolor.

Señal	Qué puedes ver	Qué hacer
Heridas y sangrado	Herida abierta o sangrado	Presiona con firmeza sobre la herida con una gasa limpia y ve al veterinario. Si sangra por la boca, nariz, trasero u otro orificio, ve de inmediato.
Convulsiones	Sacudidas, rigidez, pérdida de conciencia	Aparta objetos con los que pueda golpearse, llama al veterinario de inmediato, mantén el ambiente tranquilo.
Diarrea grave	Cacas acuosas o gelatinosas, con el conejo encorvado y decaído	Veterinario de inmediato, especialmente en conejos jóvenes.
Sangre en la orina o esfuerzo al orinar	Orina con sangre visible o hace fuerza sin orinar	Veterinario de inmediato.
Grita o chilla	Un chillido fuerte e inesperado	Revísalo con cuidado; suele indicar una herida o un dolor intenso. Llama al veterinario.

Otras señales que requieren llamar al veterinario sin demora

- Secreción en ojos o nariz.
- Babeo o pelo mojado bajo la barbilla.
- Pérdida de apetito o de peso.
- Apatía, falta de energía.
- No salta ni se mueve con normalidad.
- Diarrea, o sin cacas durante más de 12 horas.
- Orina de color rojo oscuro.
- Pérdida de pelo, piel enrojecida o inflamada.
- Rechinar los dientes con fuerza o estar encorvado: suelen ser señales de dolor.

Si sospechas un golpe de calor

1. Llévalo a la sombra o a una habitación fresca.
2. Moja sus orejas con agua fresca del grifo y luego humedece poco a poco su cuerpo, sin que el agua le llegue a la nariz ni a la boca.
3. Ofrécele agua fresca, sin forzarlo a beber.
4. Crea corriente de aire con un ventilador o abriendo ventanas.
5. No lo abracés ni lo envuelvas en una toalla mojada: retiene el calor.
6. Llama al veterinario mientras sales y viaja en un coche fresco y ventilado.

Mientras vas hacia la clínica

- ☐ Llama antes para avisar de que vas en camino.
- ☐ Usa un transportín con fondo antideslizante y una toalla.
- ☐ Si vive con otro conejo vinculado, valora llevarlo también.
- ☐ Lleva cualquier medicamento que tome y anota cuándo comió y cuándo hizo cacas por última vez.
- ☐ Mantén el coche a una temperatura moderada y conduce con suavidad.

Lo que NO debes hacer

- No esperes a ver si mejora solo cuando ha dejado de comer o de hacer cacas.
- No le des medicamentos de personas ni de otros animales.
- No le des medicamentos para el intestino sin indicación veterinaria.
- No mojes el pelo si sospechas miasis.
- No lo enfríes con hielo directamente sobre la piel ni lo envuelvas en toallas mojadas.

Mis teléfonos de emergencia

Veterinario de exóticos: _____ Teléfono: _____

Horario: _____

Clínica de urgencias 24 h: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____

Esta guía es informativa y no sustituye la evaluación de un veterinario. Ante cualquier duda, contacta con tu veterinario de exóticos.

Fuentes

1. Rabbit Emergency Signs & When to See a Vet — Rabbit Welfare Association & Fund. <https://rabbitwelfare.co.uk/welfare-need/recognising-emergencies/>
2. Illness of Rabbits — Merck Veterinary Manual. <https://www.merckvetmanual.com/all-other-pets/rabbits/illness-of-rabbits>
3. Head tilt in a rabbit — PDSA. <https://www.pdsa.org.uk/pet-help-and-advice/pet-health-hub/symptoms/head-tilt-in-a-rabbit>
4. Heatstroke in Rabbits — PDSA. <https://www.pdsa.org.uk/pet-help-and-advice/pet-health-hub/conditions/heatstroke-in-rabbits>
5. Gastrointestinal Stasis in Rabbits — VCA Animal Hospitals. <https://vcahospitals.com/know-your-pet/gastrointestinal-stasis-in-rabbits>

© 2026 Planeta Conejo, una iniciativa de El Mundo de Luna · planetaconejo.com/recursos/senales-urgencia-veterinaria · Versión del 14 de octubre de 2026. Uso personal gratuito; prohibida su venta.